

Indlægsseddel Information til brugeren

Zovir® 5 %, creme, 2g
Aciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger, lægen eller apotekspersonalet har givet dig..

- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.
- Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 10 dage.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir
3. Sådan skal du bruge Zovir
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zovir er et middel mod forkølelsessår (herpes), der virker ved at hæmme herpesvirus.

Du kan bruge Zovir til forkølelsessår på mund og læber samt i ansigtet.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Zovir for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 10 dage.

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Zovir

Brug ikke Zovir:

Hvis du er allergisk over for det aktive stof aciclovir, det beslægtede stof valaciclovir eller et af de øvrige indholdsstoffer i Zovir (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Zovir.

Du må ikke bruge Zovir creme på slimhinder (f.eks. i munden eller øjnene). Du bør især undgå at få det i øjnene. Cremen kan give irritation ved kontakt med slimhinder. Skyl rigeligt med vand, hvis det sker. Cremen er uskadelig, hvis du får lidt af den i munden og synker den.

Hvis du har en kronisk sygdom, der gør dig lettere modtagelig for betændelser, er det ikke sikkert at behandling med Zovir creme er nok. Tal med din læge.

Brug af anden medicin sammen med Zovir

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du kan bruge Zovir sammen med anden medicin.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger Zovir.

Graviditet

Du kan bruge Zovir under graviditet.

Amning

Du kan bruge Zovir, selvom du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zovir creme påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zovir

Zovir indeholder cetostearylalkohol, som kan give udslæt (f.eks. kontakteksem) og propylenglycol, som kan give irritation af huden.

3. Sådan skal du bruge Zovir

Brug altid zovir nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket / eller sundhedspersonalet.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne og børn over 2 år:

Brug cremen 5 gange daglig med ca. 4 timers mellemrum i mindst 4 dage.

Behandlingen kan fortsættes i op til 10 dage, hvis heling af såret ikke er sket efter 4 dage. Hvis såret ikke er helet efter 10 dage, kontaktes lægen.

Begynd behandlingen så hurtigt som muligt efter de første tegn på udbrud (kløe, prikkende eller sviende fornemmelse). Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelssåret. Hav altid Zovir creme med, så du kan begynde behandlingen af det næste udbrud så hurtigt som muligt.

Ved dosering med pumpen:

Hold fingerspidsen helt ind mod pumpens åbning for ikke at få for meget creme ud. Første gang kan det være nødvendigt at ryste pumpen og trykke flere gange på pumpen, før cremen kommer ud.

Vask hænder før og efter påsmøring af cremen for at undgå forværring eller spredning af infektionen. For at forhindre smittespredning til andre dele af kroppen eller i øjnene skal du undgå at berøre såret unødvendigt eller lade andre gøre det.

Børn under 2 år: Du må kun bruge Zovir efter aftale med en læge.

Hvis du har brugt for meget Zovir

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Zovir, end der står her, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af overdosering med Zovir.

Hvis du har glemt at bruge Zovir

Smør straks creme på såret og fortsæt behandlingen som hidtil.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Zovir kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget sjældne bivirkninger (det sker hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

- Akut overfølsomhedsreaktion (hævelse af tunge, læber og/eller ansigt)
Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Meget almindelige bivirkninger (det sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

- Mild udtørring af huden
- Afskalning af huden

Ikke almindelige bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1000 behandlede):

- Forbigående svie eller brændende fornemmelse
- Kløe

Sjældne bivirkninger (det sker hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede):

- Rødme i huden
- Kontakteksem
- Nældefeber

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen
Axel Heides Gade 1
DK-2300 København S
Websted: www.meldenbivirkning.dk
E-mail: [sst@sst.dk](mailto:ssst@sst.dk)

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zovir doseringspumpe ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar ikke Zovir tube eller doseringspumpe i køleskab.

Brug ikke Zovir efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester.. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toiletet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zovir creme indeholder:

- Aktivt stof: Aciclovir.
- Øvrige indholdsstoffer: Propylenglycol, hvid blød paraffin, cetostearylalkohol, paraffinolie, dimeticon, poloxamer, natriumlaurylsulfat, rensset vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvid creme.

Pakningsstørrelser

Tube: 2 g.

Doseringspumpe: 2 g

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

Glaxo Operations, Barnard Castle, England

Denne indlægsseddel blev sidst revideret 15. september 2014.

Du kan finde flere oplysninger om dette lægemiddel under "forbrugere" på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.laegemiddelstyrelsen.dk