

Zovir® (aciclovir) creme. Anvendelse: Anvendes til behandling af tilbagevendende forkølelsessår (herpes labialis) på munden og i ansigtet. **Dosering:** Voksne og børn over 2 år: Påføres det angrebne område 5 gange daglig med cirka 4 timers mellemrum, undtagen om natten. Behandlingen bør fortsættes i mindst 4 dage. Hvis heling herefter ikke er sket, kan behandlingen fortsættes i op til 10 dage. Hvis såret da ikke er helet, bør man kontakte lægen. Tidlig behandling kan stoppe udviklingen af forkølelsessåret. **Forsigtighedsregler:** For at undgå irritation må Zovir creme ikke anvendes på slimhinder (f.eks. i munden, i vagina og i øjnene). **Bivirkninger:** Meget sjældne: Akut overfølsomhedsreaktion. Ikke almindelige: Forbigående svie eller brændende fornemmelse, kløe. Almindelige: Mild udtørring og afskalning af huden. **Graviditet og amning:** Kan anvendes. **Pakningsstr. og priser 11.05.2015:** Zovir 5 % creme tube 2g og pumpe 2g: Ingen vejledende mindstepris
Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på emballagen.
Zovir® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af firmaer.